

# Proktosanol przeciw hemoroidom doodbytnicza maść 40 g Starpharma



cena: 15,49 PLN

## Opis słownikowy

Czas dostawy	2-5 dni
Opakowanie	40 gram
Postać	maść
Producent	INNE
Rejestracja	lek OTC
Substancja czynna	złożone
Zastosowanie	hemoroidy

## Opis produktu

Opis - Proktosanol, maść przeciw hemoroidom, 40 g  
Proktosanol, maść przeciw hemoroidom to homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Produkt homeopatyczny Proktosanol - maść przeciw hemoroidom zmniejsza nasilenie zmian chorobowych występujących w leczeniu wewnętrznych i zewnętrznych guzków krwawniczych odbytu z objawami pieczenia i bolesności, goi pęknięcia w obrębie guzków krwawniczych. Działa wspomagająco w leczeniu świądu sromu.

Wskazania - Proktosanol, maść przeciw hemoroidom, 40 g  
Leczenie wewnętrznych i zewnętrznych guzków krwawniczych odbytu (hemoroidów) z objawami pieczenia i bolesności. Gojenie pęknięć w obrębie guzków krwawniczych. Wspomagająco w leczeniu świądu sromu.

Skład - Proktosanol, maść przeciw hemoroidom, 40 g  
100 g maści zawiera

Hamamelis Virginiana TM - 9,0g

Aloe D3 - 2,0g;

Paeonia Officinalis D3 - 2,0g

Substancje pomocnicze

wodorotlenek sodu, 4-hydroksybenzoesan etylu, gliceryna, biała wazelina, ciekła parafina, polisorbat 60, monostearynian glicerolu, alcohol cetostearylowy, woda oczyszczona, imidazolidynylomocznik, kwas benzoesowy.



Dawkowanie - Proktosanol, maść przeciw hemoroidom, 40 g

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, smarować cienką warstwą maści miejsca chorobowo zmienione. Maść stosować 1-2 razy dziennie, w razie potrzeby częściej.

Przeciwwskazania - Proktosanol, maść przeciw hemoroidom, 40 g

Nadwrażliwość na substancje czynne lub składniki podłoża maści.

Zawartość:

Tuba aluminiowa zawierająca 40 g maści

Producent / Podmiot odpowiedzialny: STARPHARMA

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Pozwolenie: IL-5635/LN-H

Kod EAN: 5909990635078

Ważne przed zastosowaniem - Proktosanol, maść przeciw hemoroidom, 40 g Ostrzeżenia - Proktosanol, maść przeciw hemoroidom, 40 g

Nie należy stosować leku jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

U dzieci nie stosować bez porozumienia z lekarzem.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Działania niepożądane - Proktosanol, maść przeciw hemoroidom, 40 g

Nie stwierdzono. W razie wystąpienia niepokojących objawów należy lek odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309

e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl)

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Interakcje z innymi lekami - Proktosanol, maść przeciw hemoroidom, 40 g

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji z innymi lekami i innych rodzajów interakcji.

Ciąża i laktacja - Proktosanol, maść przeciw hemoroidom, 40 g

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży lub laktacji. Nie stosować bez porozumienia z lekarzem.