

# Salicylol 5% 100 ml płyn na skórę z łuszczycą Profarm LEK

cena: 33,99 PLN



## Opis słownikowy

|              |         |
|--------------|---------|
| Czas dostawy | 2-5 dni |
| Opakowanie   | 100 g   |
| Postać       | płyn    |
| Producent    | INNE    |
| Rejestracja  | lek OTC |
| Zastosowanie | Skóra   |

## Opis produktu

### Opis

Lek Salicylol jest olejowym roztworem kwasu salicylowego, o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i łagodnie keratolitycznym tzn. działającym rozpuszczająco na naskórek.

### Wskazania

Lek Salicylol wskazany jest szczególnie do:

Leczenia łojotokowego zapalenia skóry, objawiającego się uporczywym łupieżem.

Zakażeń grzybiczych tj. grzybicy powierzchownej owłosionej skóry głowy, grzybicy skóry głowy z odczynem zapalnym, łupieżu pstrego.

Pomocniczo w leczeniu trądziku.

Substancja czynna: Acidum salicylicum, Ricini oleum

### Skład

Kwas salicylowy 50 mg/g

Olej rycynowy 950 mg/g

### Dawkowanie

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Dorosłym i dzieciom powyżej 3 roku życia preparat wcierać przy pomocy nasączonego zwitka waty w zmienioną chorobowo powierzchnię skóry głowy, odgarniając włosy. Głowę umyć po upływie 1 - 2 godzin. Zabieg powtórzyć kilka razy w odstępie 3 - 4 dni. U dzieci poniżej 3 roku życia stosować tylko zgodnie ze wskazaniami lekarza.



**Przeciwwskazania**  
Preparatu nie należy stosować

W ostrych stanach zapalnych skóry;

na otwarte rany;

na duże powierzchnie skóry oraz na błony śluzowe. W razie kontaktu z błonami śluzowymi preparat zmyć ciepłą wodą.

Nie stosować leku jeżeli osoba jest uczulona na którykolwiek ze składników i u dzieci do 3 roku życia.

**Zawartość:**

Butelka ze szkła oranżowego, zaopatrzona w zakrętkę z twardego polietylenu, zawierająca 100 g preparatu. Butelka wraz z ulotką informacyjną umieszczona jest w oznakowanym tekturowym kartoniku.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PROFARM

Pozwolenie: MZ R/2609

Kod EAN: 5909990260911

**Ważne przed zastosowaniem Ostrzeżenia**

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie stosować na duże powierzchnie skóry z uwagi na możliwość resorpcji kwasu salicylowego, unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa, w razie potrzeby zmyć ciepłą wodą.

**Ciąża i laktacja**

**Ciąża:**

Przed zastosowaniem (każdego) leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży.

**Karmienie piersią:**

Przed zastosowaniem (każdego) leku należy poradzić się lekarza

Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie karmienia piersią

**Prowadzenie pojazdów**

Lek Salicylol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

**Dodatkowe informacje**

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**Interakcje z innymi lekami**

Nie stosować jednocześnie z preparatami na skórę zawierającymi rezorcynę i riwanol ponieważ mogą pojawić się reakcje chemiczne pomiędzy kwasem salicylowym i wymienionymi składnikami.

**Działania niepożądane**

Jak każdy lek, SALICYLOL, może powodować działania niepożądane.

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić reakcje uczuleniowe skóry. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zaprzestać



stosowania preparatu i zasięgnąć opinii lekarza.

U niektórych osób w czasie stosowania leku SALICYLOL mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, w tym wszystkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: +48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309,

e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl).

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.